

Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität Bonn  
Direktor: Prof. Dr. Tiemann

---

# **Über das Verhalten der insulinzerstörenden Kraft des Blutes bei Kranken mit Lungen- tuberkulose, Karzinomen und Leberzirrhose**

**Inaugural-Dissertation**

zur

Erlangung des Doktorgrades

der Hohen Medizinischen Fakultät  
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität zu Bonn

Vorgelegt am 7. Juli 1939

von

**Ferdinand Schipper**

Arzt aus Bottrop i. W.



Buch- und Kunstdruckerei

Wilh. Postberg, Bottrop i.W.

1939

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät  
der Universität Bonn.

Referent: Doz. Dr. Kohl.

Korreferent: Prof. Dr. Tiemann.



*Meinen Eltern in Liebe und Dankbarkeit  
zugeeignet.*



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

[https://archive.org/details/IA41546405\\_0005](https://archive.org/details/IA41546405_0005)

Nach Untersuchungen von Bürger und Kohl (1) zeigt die Injektion von Insulin je nach Wahl des Applikationsortes eine verschiedene Wirksamkeit hinsichtlich der Tiefe und Dauer der Blutzuckersenkung. Die Insulinwirkung tritt am raschesten ein bei intravenöser Injektion, zeigt aber nur kurzanhaltende Wirkung. Bürger und Kohl erklärten diese Tatsache dadurch, daß im Blute Kräfte vorhanden sind, die das Insulin inaktivieren oder zerstören.

In dieser Richtung ist auch die früher von Bürger und Kramer (2) mitgeteilte Beobachtung zu erklären, daß im Tierversuch die Wirkung des Insulins ausbleibt, wenn man die Extremitätenmuskulatur abdrosselt, und zwar auch dann noch, wenn man nach einstündiger Zirkulationsunterbrechung die Durchblutung der Muskulatur wieder freigibt.

Weitere Versuche zeigten, daß eine gleichbleibende Insulinmenge ihre blutzuckersenkende Wirkung verliert, wenn man sie in vitro mit überlebendem Blut zusammenbringt. Diese insulinzerstörende Eigenschaft wurde von Bürger und Kohl als die insulinzerstörende Kraft des Blutes (IZK) bezeichnet.

Die Herstellung von kristallinischem Insulin führte zu einer neuen Reihe von Versuchen.

Als einer der wirksamen Faktoren bei der Zerstörung des Insulins wurde eine fermentative Wirkung des Blutes, die vermutlich den Leukozyten anhaftet, angenommen.

Unter Einhaltung bestimmter Versuchsbedingungen zeigte es sich, daß das Blut von Leukämikern das Insulin schneller zerstört als das Blut Gesunder. H. Kohl, H. Selbach und A. Janning (3) zeigten ferner, daß die insulinzerstörende Kraft des Blutes vom Alter des Blutspenders abhängig ist. So zerstört das Blut des gesunden jugendlichen Probanden unter 20 Jahren das Insulin nach durchschnittlich 28,3 Stunden, das Blut von Erwachsenen im Alter von 20 bis 30 Jahren nach durchschnittlich 22 Stunden, das Blut von Erwachsenen im Alter von 30 bis

40 Jahren nach durchschnittlich 21,1 Stunden. In der folgenden Altersstufe tritt die Zerstörung des Insulins nach 21,3 Stunden ein, in der Altersstufe bis 60 Jahren nach 21,4 Stunden und bei Blutspendern über 60 Jahre bereits nach 18,3 Stunden.

Es tritt also mit zunehmendem Alter eine raschere Zerstörung des Insulins ein.

Die Untersuchungen von Kohl und Tochtermann (4) zeigten, daß das Blut von Diabetikern bereits nach durchschnittlich 8 Stunden das Insulin zerstört.

Da nun die Untersuchungen bei Leukämie und Diabetes mellitus eine von der Norm abweichende Zerstörung des Insulins zeigten, fragte es sich, ob auch andere Krankheitsbilder eine Beeinflussung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes zeigen.

Meine Aufgabe war es nun, bei Kranken mit Leberzirrhose, Karzinomen und Lungentuberkulose die insulinzerstörende Kraft des Blutes zu prüfen.

### Versuchsanordnung.

Das Blut der Kranken wird durch Venenpunktion unter sterilen Bedingungen entnommen und in einem von Kohl angegebenen Apparat durch Drehen des Glockenrührers defibriniert. Das defibrinierte Blut wird in kleine geeichte Glasgefäße von 4,5 ccm Inhalt gebracht, in die vorher das Insulin gebracht war (40  $\gamma$  kristallinisches Insulin gelöst in 0,5 ccm Phosphatpufferlösung von ph 7,34). Die Glasgefäßchen befinden sich dabei in einem Wasserbad von 37° C. Das Blut-Insulingemisch wird bei 37° C im Brutschrank gehalten. Nach verschieden langer Kontaktdauer, die jeweils in den Tabellen angegeben ist, wird das einzelne Gemisch den Kaninchen intraperitoneal injiziert. In zweistündigen Blutzuckeruntersuchungen von je einer halben Stunde Abstand wird die Wirkung des Insulins im Blut-Insulingemisch auf den Kaninchenblutzucker beobachtet. Als Testtiere wurden Kaninchen von ca. 2000 Gramm verwendet.

Der Kaninchenblutzuckerspiegel dient also als Test für die Feststellung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes.

## Versuchsergebnisse.

Die in den nachstehenden Tabellen angegebenen Kaninchenblutzuckerwerte geben eine Darstellung der Wirksamkeit der insulinzerstörenden Kraft des Blutes im Blut-Insulingemisch. Die Blutzuckerbestimmungen wurden nach Hagedorn-Jensen vorgenommen, und in allen Fällen wurden Doppelbestimmungen gemacht. Als Zeichen für die eingetretene Zerstörung des Insulins wurde die Kontaktdauer des Blut-Insulingemisches in Stunden festgesetzt, bei welcher eine Senkung des Blutzuckers beim Testtier nicht mehr festzustellen war.

### Die insulinzerstörende Kraft des Blutes bei Kranken mit Lungentuberkulose.

In den Tabellen 1—6 ist die Wirkung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes von sechs Kranken mit Lungentuberkulose dargestellt. In Tabelle 1 und 2 sehen wir die Zerstörung des Insulins nach 28 bzw. 27 Stunden angedeutet. Bei den Blutspendern handelt es sich um jugendliche Tuberkulose unter 20 Jahren. Die Inaktivierungszeit des Insulins durch das Blut gesunder Blutspender liegt in dieser Altersstufe bei 28,3 Stunden Kontaktdauer.

Tabelle 3 und 4 zeigen eine Inaktivierung des Insulins nach 25 bzw. 24 Stunden. Die Blutspender sind erwachsene Tuberkulose über 20 Jahre alt. Die Inaktivierungszeit Gesunder liegt in dieser Altersstufe bei einer Kontaktdauer von 22 Stunden.

Tabelle 5 zeigt den Eintritt der Zerstörung des Insulins nach 21 Stunden Kontaktdauer an. Es handelt sich bei dem Blutspender um einen Kranken von 37 Jahren. Die Inaktivierungszeit des Insulins durch das Blut Gesunder in dieser Altersstufe liegt bei 21 Stunden Kontaktdauer.

Tabelle 6 zeigt gleichfalls eine Zerstörung des Insulins nach 21 Stunden Kontaktdauer. Der Blutspender ist ein über 20 Jahre alter Kranker. Die Inaktivierungszeit des Insulins durch das Blut gesunder Blutspender liegt in dieser Altersstufe bei einer Kontaktdauer von 22 Stunden.

In den Tabellen 3 und 4 finden wir eine Abweichung von 3 bzw. 2 Stunden von der normalen Inaktivierungszeit, die in der

Altersstufe der Blutspender im Mittelwert bei 22 Stunden Kontaktdauer liegt. Es ist dieses Abweichen dadurch zu erklären, daß die physiologische Schwankungsbreite der insulinzerstörenden Kraft des Blutes in dieser Altersstufe beträchtlich ist, was natürlich im Durchschnittswert nicht zum Ausdruck kommt.

Der Mittelwert für die insulinzerstörende Kraft des Blutes, errechnet bei sechs Kranken mit Lungentuberkulose, liegt bei 24,3 Stunden.

Dieser Mittelwert von 24,3 Stunden zeigt keine nennenswerte Abweichung\* von der Insulininaktivierungszeit des Blutes gesunder Blutspender.

Wie erwähnt, liegt der Normalwert für die Inaktivierungszeit in der Altersstufe unter 20 Jahren bei 28,3 Stunden, in der Altersstufe von 20 bis 30 Jahren bei 22 Stunden, in der Altersstufe von 30 bis 40 Jahren bei 21,1 Stunden Kontaktdauer.

Der errechnete Durchschnittswert von 24,3 Stunden deckt sich deswegen nicht vollständig mit den Normalwerten, weil die untersuchten Kranken nicht in derselben Altersstufe standen. Um so deutlicher tritt die Inaktivierungszeit als normal in Erscheinung, wenn man die erhobenen Inaktivierungszeiten in den oben näher ausgeführten Altersklassen berücksichtigt.

Tabelle 1.

Name des Patienten: Flohr, Karl. Alter: 16 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Lungentuberkulose, doppelseitig, kavernös. Pneumothorax.

Sputum: Ø. Leukozyten: 6400.

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 110  | 111  | 112  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 2150 | 1750 | 2200 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 22   | 25   | 28   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 101  | 102  | 97   |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 99   | 86   | 103  |
| 1 Stunde                               | 95   | 81   | 129  |
| 1½ Stunde                              | 81   | 77   | 124  |
| 2 Stunden                              | 74   | 72   | 99   |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | 0    | +    |

Tabelle 2.

Name des Patienten: Karl, Maria. Alter: 18 Jahre.

Geschlecht: weiblich.

Krankheit: Lungentuberkulose, linksseitig, kavernös-fibrös.

Sputum: Ø.

Leukozyten: 6800.

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 114  | 115  | 116  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 1800 | 1950 | 1900 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 25   | 27   | 29   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 89   | 84   | 78   |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 76   | 84   | 102  |
| 1 Stunde                               | 71   | 91   | 105  |
| 1½ Stunde                              | —    | 94   | 96   |
| 2 Stunden                              | —    | 103  | 87   |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | +    | +    |

Tabelle 3.

Name des Patienten: Fussel, August. Alter: 25 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Lungentuberkulose, linksseitig, kavernös. Pneumothorax.

Sputum: +.

Leukozyten: 10 000.

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 117  | 118  | 119  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 1750 | 1750 | 1950 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 21   | 23   | 25   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 97   | 90   | 91   |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 83   | 100  | 114  |
| 1 Stunde                               | 74   | 88   | 107  |
| 1½ Stunde                              | 74   | 88   | 94   |
| 2 Stunden                              | 79   | 87   | —    |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | 0    | +    |

Tabelle 4.

Name des Patienten: Pannes, Andreas, Alter: 22 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Lungentuberkulose, rechtsseitig, kavernös, Pneumothorax.

Sputum: Ø.

Leukozyten: 8600.

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 120  | 121  | 122  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 1750 | 2100 | 1850 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 20   | 22   | 24   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 95   | 86   | 88   |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 81   | 109  | 104  |
| 1 Stunde                               | 77   | 100  | 104  |
| 1½ Stunde                              | 64   | 115  | 100  |
| 2 Stunden                              | 79   | 106  | 115  |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | 0    | +    |

Tabelle 5.

Name des Patienten: Hesse, Karl. Alter: 37 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Lungentuberkulose, kavernös, Thorakoplastik rechts.

Sputum: +.

Leukozyten: 7200.

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 124  | 125  | 126  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 2000 | 2050 | 2150 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 21   | 23   | 25   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 109  | 95   | 104  |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 120  | 110  | 104  |
| 1 Stunde                               | 125  | 125  | 102  |
| 1½ Stunde                              | 122  | —    | 100  |
| 2 Stunden                              | 118  | —    | 104  |
| Insulinzerstörungseffekt:              | +    | +    | +    |

Tabelle 6.

Name des Patienten: Wolter Karl. Alter: 22 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Lungentuberkulose, kavernös, linksseitig, Pneumothorax.

Sputum: +.

Leukozyten: 8000.

|                                        |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 127  | 128  | 129  | 130  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 1750 | 2150 | 1850 | 1750 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 18   | 21   | 24   | 27   |

| Kaninchenblutzucker in mg %          |    |     |     |     |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| Vor der intraperitonealen Injektion  | 99 | 90  | 117 | 102 |
| Nach der intraperitonealen Injektion |    |     |     |     |
| ½ Stunde                             | 84 | 91  | 124 | 111 |
| 1 Stunde                             | 77 | 99  | 126 | 107 |
| 1½ Stunde                            | 68 | 100 | 114 | 104 |
| 2 Stunden                            | 68 | 91  | —   | 105 |
| Insulinerstörungseffekt:             | 0  | +   | +   | +   |

### Die insulinzerstörende Kraft des Blutes bei Kranken mit Karzinomen.

In den Tabellen 7—12 ist die Wirkung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes bei sechs Karzinom-Kranken dargestellt.

Tabelle 7 zeigt das Eintreten der Insulinzerstörung nach 21 Stunden Kontaktdauer an. Die Blutspenderin ist eine 58jährige Kranke mit inoperablem Magenkarzinom. Die Inaktivierungszeit des Insulins durch das Blut gesunder Blutspender liegt in dieser Altersstufe bei 21,4 Stunden Kontaktdauer.

In Tabelle 8 sehen wir ein Eintreten der Insulininaktivierung bereits nach 18 Stunden Kontaktdauer. Es handelt sich um einen Kranken von 76 Jahren mit einem Rektumkarzinom. Die normale Inaktivierungszeit des Insulins durch das Blut Gesunder liegt in dieser Altersstufe bei 18,3 Stunden Kontaktdauer.

Tabelle 9 zeigt den Eintritt der Inaktivierung des Insulins nach 22 Stunden Kontaktdauer an. Der Blutspender ist ein 59 Jahre alter Kranker mit einem Lippenkarzinom. Die normale Inaktivierungszeit liegt in der Altersstufe des Kranken bei 21,4 Stunden Kontaktdauer.

Tabelle 10 zeigt den Eintritt der Inaktivierung des Insulins nach 18 Stunden Kontaktdauer an. Der Blutspender ist ein 71jähriger Kranker mit einem Prostatakarzinom. Die normale Inaktivierungszeit liegt bei gesunden Blutspendern über 60 Jahre bei 18,3 Stunden Kontaktdauer.

Tabelle 11 zeigt eine Inaktivierung des Insulins nach 20 Stunden an. Der Blutspender ist ein 36 Jahre alter Kranker mit Prostatakarzinom. Die normale Inaktivierungszeit des Insulins durch das Blut gesunder Blutspender liegt in dieser Altersstufe bei 21,1 Stunden Kontaktdauer.

Tabelle 12 zeigt eine Inaktivierung des Insulins nach 20 Stunden Kontaktdauer an. Der Blutspender ist ein 64 Jahre alter Patient mit einem Prostatakarzinom. Die normale Inaktivierungszeit für Blutspender über 60 Jahre liegt bei 18,3 Stunden Kontaktdauer.

Der Mittelwert der Inaktivierungszeit des Insulins, errechnet bei sechs Kranken mit Karzinomen, liegt bei 21,5 Stunden Kontaktdauer.

Ein Abweichen von den Normalwerten bei Gesunden liegt demnach nicht vor.

T a b e l l e 7.

Name des Patienten: Lehmler, Anna. Alter: 58 Jahre.

Geschlecht: weiblich.

Krankheit: Magenkarzinom, inoperabel, Gastroenterostomie.

Leukozyten: 4200.

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 71   | 44   | 70   |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 2150 | 2100 | 1850 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 18   | 21   | 24   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 129  | 127  | 106  |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 117  | 127  | 117  |
| 1 Stunde                               | 106  | 129  | 113  |
| 1½ Stunde                              | 99   | 127  | 106  |
| 2 Stunden                              | 117  | 131  | 105  |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | +    | +    |

T a b e l l e 8.

Name des Patienten: Simon, Anton. Alter: 76 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Rektumkarzinom.

Leukozyten: 5600.

|                                         |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                   | 106  | 107  | 108  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm         | 2050 | 2200 | 1900 |
| Kontakttdauer Insulin + Blut in Stunden | 16   | 18   | 21   |
| Kaninchenblutzucker in mg %             |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion     | 98   | 98   | 88   |
| Nach der intraperitonealen Injektion    |      |      |      |
| ½ Stunde                                | 56   | 95   | 89   |
| 1 Stunde                                | 63   | 104  | 93   |
| 1½ Stunde                               | 67   | 93   | 95   |
| 2 Stunden                               | 69   | 100  | 84   |
| Insulinzerstörungseffekt:               | 0    | +    | +    |

Tabelle 9.

Name des Patienten: Bachus, Heinrich. Alter: 59 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Karzinom der Unterlippe.

Leukozyten: 4800.

|                                         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                   | 131  | 132  | 133  | 134  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm         | 2100 | 1950 | 2300 | 1850 |
| Kontakttdauer Insulin + Blut in Stunden | 16   | 19   | 22   | 25   |
| Kaninchenblutzucker in mg %             |      |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion     | 106  | 124  | 119  | 112  |
| Nach der intraperitonealen Injektion    |      |      |      |      |
| ½ Stunde                                | 99   | 106  | 114  | 110  |
| 1 Stunde                                | 92   | 104  | 133  | 115  |
| 1½ Stunde                               | —    | 117  | 115  | 115  |
| 2 Stunden                               | 70   | 115  | 115  | 112  |
| Insulinzerstörungseffekt:               | 0    | 0    | +    | +    |

Tabelle 10.

Name des Patienten: Ramscheidt, Alexander. Alter: 71 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Prostatakarzinom.

Leukozyten: 7800.

|                                         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                   | 135  | 136  | 137  | 138  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm         | 1950 | 2000 | 2000 | 1800 |
| Kontakttdauer Insulin + Blut in Stunden | 15   | 18   | 21   | 24   |
| Kaninchenblutzucker in mg %             |      |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion     | 86   | 96   | 117  | 112  |
| Nach der intraperitonealen Injektion    |      |      |      |      |
| ½ Stunde                                | 77   | 119  | 131  | 123  |
| 1 Stunde                                | 73   | 121  | 117  | 124  |
| 1½ Stunde                               | 80   | 119  | 119  | 112  |
| 2 Stunden                               | 78   | 121  | 121  | 110  |
| Insulinzerstörungseffekt:               | 0    | +    | +    | +    |

Tabelle 11.

Name des Patienten: Roßbach, Jakob. Alter: 35 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Prostatakarzinom mit Perforation in das Rektum.

Leukozyten: 5200.

|                                        |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 139  | 140  | 141  | 142  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 2050 | 2100 | 1900 | 1850 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 16   | 20   | 22   | 24   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 116  | 100  | 100  | 93   |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 111  | 143  | 118  | 107  |
| 1 Stunde                               | 107  | 155  | 114  | 92   |
| 1½ Stunde                              | 97   | 165  | —    | 99   |
| 2 Stunden                              | 100  | 175  | —    | 107  |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | +    | +    | +    |

Tabelle 12.

Name des Patienten: Rasmes, Karl. Alter: 64 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Rektumkarzinom.

Leukozyten: 8600.

|                                        |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 143  | 144  | 145  | 146  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 1900 | 1750 | 2000 | 1950 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 16   | 18   | 20   | 23   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 81   | 104  | 107  | 90   |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 79   | 97   | 125  | 95   |
| 1 Stunde                               | 63   | 86   | 121  | 97   |
| 1½ Stunde                              | 50   | 90   | —    | 93   |
| 2 Stunden                              | —    | 90   | —    | 97   |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | 0    | +    | +    |

Tabelle 13.

Name des Patienten: Vogelsberg, Math. Alter: 57 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Leberzirrhose.

Leukozyten: 5200.

|                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                      | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 71   | 87   |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm            | 2150 | 2050 | 2350 | 2200 | 1900 | 2900 | 2000 | 2100 |
| Kontakt-dauer Insulin + Blut<br>in Stunden | 16   | 18   | 20   | 24   | 26   | 28   | 30   | 32   |

| Kaninchenblutzucker in mg %          |     |     |     |     |    |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Vor der intraperitonealen Injektion  | 100 | 114 | 121 | 103 | 95 | 170 | 132 | 139 |
| Nach der intraperitonealen Injektion |     |     |     |     |    |     |     |     |
| ½ Stunde                             | 100 | 73  | 105 | 103 | 84 | 182 | 130 | 139 |
| 1 Stunde                             | 74  | 56  | 74  | 83  | 82 | 129 | 127 | 146 |
| 1½ Stunde                            | 69  | 49  | 76  | 89  | 75 | —   | 113 | —   |
| 2 Stunden                            | 71  | 51  | 74  | 94  | 73 | —   | 123 | —   |

Insulinzerstörungseffekt: 0 0 0 0 0 0 0 0 +

Tabelle 14.

Name des Patienten: Röhrig, Christian. Alter: 68 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Leberzirrhose.

Leukozyten: 6000.

|                                         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                   | 94   | 21   | 22   | 23   | 81   |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm         | 2400 | 2250 | 2550 | 2100 | 2250 |
| Kontakt-dauer Insulin + Blut in Stunden | 24   | 26   | 28   | 30   | 32   |

| Kaninchenblutzucker in mg %          |    |    |     |    |    |
|--------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| Vor der intraperitonealen Injektion  | 82 | 55 | 112 | 73 | 66 |
| Nach der intraperitonealen Injektion |    |    |     |    |    |
| ½ Stunde                             | 68 | 41 | 66  | 68 | 69 |
| 1 Stunde                             | 44 | 59 | 75  | 78 | 73 |
| 1½ Stunde                            | —  | 60 | 100 | 87 | 87 |
| 2 Stunden                            | —  | 64 | 77  | 82 | 85 |

Insulinzerstörungseffekt: 0 0 0 + +

Tabelle 15.

Name des Patienten: Dümpelfeld, Math., Alter: 66 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Leberzirrhose.

Leukozyten: 8400.

|                                         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                   | 44   | 43   | 41   | 42   |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm         | 2850 | 2650 | 2350 | 2600 |
| Kontakt-dauer Insulin + Blut in Stunden | 24   | 26   | 28   | 30   |

| Kaninchenblutzucker in mg %          |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Vor der intraperitonealen Injektion  | 131 | 124 | 127 | 136 |
| Nach der intraperitonealen Injektion |     |     |     |     |
| ½ Stunde                             | 104 | 115 | 101 | 136 |
| 1 Stunde                             | 104 | 108 | 95  | 139 |
| 1½ Stunde                            | 99  | 102 | 93  | 136 |
| 2 Stunden                            | 136 | 106 | 106 | 143 |

Insulinzerstörungseffekt: 0 0 0 +

Tabelle 16.

Name des Patienten: Weber, Therese. Alter: 34 Jahre.

Geschlecht: weiblich.

Krankheit: Leberzirrhose.

Leukozyten: 4200.

|                                        |      |      |
|----------------------------------------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 147  | 148  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 1950 | 1800 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 28   | 30   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 83   | 73   |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |
| ½ Stunde                               | 64   | 89   |
| 1 Stunde                               | 66   | 89   |
| 1½ Stunde                              | 67   | 93   |
| 2 Stunden                              | 75   | 96   |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | +    |

Tabelle 17.

Name des Patienten: Hartmann, Wilhelm. Alter: 62 Jahre.

Geschlecht: männlich.

Krankheit: Leberzirrhose.

Leukozyten: 6200.

|                                        |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 1850 | 1900 | 2150 | 1950 | 1900 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 25   | 26   | 28   | 29   | 31   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 126  | 124  | 105  | 89   | 100  |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 110  | 103  | 93   | 119  | 124  |
| 1 Stunde                               | 103  | 103  | 84   | 131  | 122  |
| 1½ Stunde                              | 110  | 105  | 71   | —    | 117  |
| 2 Stunden                              | 105  | 110  | 77   | —    | 119  |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | 0    | 0    | +    | +    |

Tabelle 18.

Name des Patienten: Quodt, Katharina. Alter: 56 Jahre.

Geschlecht: weiblich.

Krankheit: Leberzirrhose.

Leukozyten: 5600.

|                                        |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nummer des Kaninchens                  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  |
| Gewicht des Kaninchens in Gramm        | 1950 | 2200 | 2050 | 2150 | 2250 |
| Kontaktdauer Insulin + Blut in Stunden | 22   | 25   | 27   | 29   | 31   |
| Kaninchenblutzucker in mg %            |      |      |      |      |      |
| Vor der intraperitonealen Injektion    | 104  | 93   | 88   | 84   | 119  |
| Nach der intraperitonealen Injektion   |      |      |      |      |      |
| ½ Stunde                               | 93   | 100  | 123  | 84   | 121  |
| 1 Stunde                               | 97   | 114  | 125  | 81   | 118  |
| 1½ Stunde                              | 97   | 111  | 121  | 84   | 116  |
| 2 Stunden                              | 105  | 112  | 118  | —    | 116  |
| Insulinzerstörungseffekt:              | 0    | +    | +    | +    | +    |

### Die insulinzerstörende Kraft des Blutes bei Kranken mit Leberzirrhose.

In den Tabellen 13—18 ist die Wirksamkeit der insulinzerstörenden Kraft des Blutes bei sechs Kranken mit Leberzirrhose dargestellt. Tabelle 13 zeigt das Eintreten der Insulinzerstörung nach einer Kontaktdauer von 32 Stunden. Es handelt sich um einen 57 Jahre alten Patienten. Der Mittelwert für die insulinzerstörende Kraft des Blutes Gesunder liegt in dieser Altersstufe bei 21,4 Stunden.

In Tabelle 14 ist die Wirkung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes nach 30 Stunden Kontaktdauer erfolgt. Der Blutspender ist ein 68jähriger Patient. Die Inaktivierungszeit des Insulins durch das Blut Gesunder erfolgt nach 18,3 Stunden im Mittelwert.

In den Tabellen 15 und 16 ist die insulinzerstörende Kraft des Blutes nach 30 Stunden Kontaktdauer eingetreten. In Tabelle 15 ist der Blutspender ein 66jähriger Patient, die Wirkung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes erfolgt in dieser Altersstufe im Mittelwert nach 18,3 Stunden. In Tabelle 16 ist der Blutspender eine 34jährige Patientin, die Wirkung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes Gesunder in dieser Altersstufe liegt bei 21,1 Stunden.

In Tabelle 17 ist die Wirkung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes nach 29 Stunden eingetreten. Der Blutspender ist ein 62jähriger Patient, die Wirkung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes Gesunder in dieser Altersstufe tritt nach 18,3 Stunden ein.

In Tabelle 18 ist die Wirkung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes nach 25 Stunden Kontaktdauer eingetreten. Die Inaktivierungszeit des Insulins durch das Blut Gesunder liegt in dieser Altersstufe bei 21,4 Stunden Kontaktdauer; es handelt sich um eine 56jährige Patientin.

Der Mittelwert von sechs untersuchten Kranken liegt bei 29,3 Stunden.

Bei den Kranken mit Leberzirrhose ist das deutlich spätere Eintreten der Insulinzerstörung auffällig. Das Wirksamwerden der insulinzerstörenden Kraft des Blutes tritt in einem Falle (Tabelle 13) 10,6 Stunden, in zwei Fällen (Tabelle 14 und 15) 11,7 Stunden, in einem Falle (Tabelle 16) 8,9 Stunden und in einem Falle (Tabelle 17) 10,7 Stunden später ein, als es der Norm entspricht. In einem Falle (Tabelle 18) ist dagegen nur ein um 3,6 Stunden späteres Eintreten der Wirksamkeit der insulinzerstörenden Kraft des Blutes festzustellen. Dieses Abweichen um 3,6 Stunden kann man noch als im Bereich der physiologischen Schwankungsbreite der insulinzerstörenden Kraft des Blutes liegend annehmen.

Um so auffälliger ist bei den anderen Kranken mit Leberzirrhose das so stark verzögerte Eintreten der Wirksamkeit der insulinzerstörenden Kraft des Blutes. Man kann daher annehmen, daß bei diesen Kranken mit Leberzirrhose (Tabellen 13—17) die im Blut wirksamen Kräfte für die Zerstörung des Insulins vermindert sind.

Es kann daher die Vermutung ausgesprochen werden, daß die Leber mit der Bildung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes in Zusammenhang steht.

### **Zusammenfassung.**

1. Bei sechs Kranken mit Lungentuberkulose liegt die insulinzerstörende Kraft des Blutes im Mittelwert bei 24,3 Stunden Kontaktdauer. Die Einzelwerte zeigen keine nennenswerte Abweichung von der normalen Insulinzerstörungszeit.

2. Bei sechs Kranken mit Karzinomen liegt die insulinzerstörende Kraft des Blutes im Mittelwert bei 21,5 Stunden Kontakt-

dauer. Ein Vergleich mit der normalen Inaktivierungszeit von Insulin durch Blut in den jeweiligen Altersklassen ergibt ebenfalls keine deutliche Abweichung von der Norm.

3. Bei sechs Kranken mit Leberzirrhose liegt die insulinzerstörende Kraft des Blutes bei 29,3 Stunden Kontaktdauer im Mittelwert.

Diese Beobachtung spricht dafür, daß die Leber wahrscheinlich bei der Bildung der insulinzerstörenden Kraft des Blutes eine maßgebliche Rolle spielt.

---

Zum Schlusse spreche ich Herrn Doz. Dr. H. Kohl für die Anregung zu dieser Arbeit, für die freundliche Unterstützung bei ihrer Anfertigung und für die Übernahme des Referates, sowie Herrn Prof. Dr. Tiemann für das Korreferat meinen aufrichtigsten Dank aus.

---

### Literaturangabe.

1. Bürger und H. Kohl: Über kristallinisches Insulin. Arch. für experimentelle Pathologie Bd. 173.
2. Bürger und Kramer: Arch. f. experimentelle Pathologie Bd. 156.
3. H. Kohl, H. Selbach und A. Janning: Über kristallinisches Insulin. Arch. f. experimentelle Pathologie Bd. 185.
4. W. Tochtermann: Dissertation 1937.

## Lebenslauf.

Am 4. Mai 1913 wurde ich, Ferdinand Gustav Schipper, als Sohn des Arztes Dr. med. Gustav Schipper und seiner Ehefrau, Maria geb. Terbeck, zu Bottrop in Westfalen geboren. Nach 4jährigem Besuch der Volksschule kam ich auf das Städtische Gymnasium zu Bottrop. Hier bestand ich im Februar 1932 die Reifeprüfung. Meine vorklinischen Semester verbrachte ich in Bonn und Münster, wo ich im Februar 1935 die ärztliche Vorprüfung bestand. In den klinischen Semestern studierte ich an den Universitäten Hamburg und Bonn. Am 26. Februar 1938 bestand ich in Bonn die ärztliche Staatsprüfung. Während des Praktischen Jahres war ich an der Medizinischen Universitäts-Poliklinik in Bonn tätig. Am 1. März 1939 erhielt ich die Bestallung als Arzt.